

SPOSÓB PODAWANIA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

Żywnienie można podawać 4 sposobami:

Bolusy. Ustalona porcja jest podawana powoli strzykawką (zwykle o pojemności 50 ml) w określonym czasie. Szybkość podawania nie powinna przekraczać 30 ml/min. Ten sposób stosuje się zwykle wtedy, gdy pacjent jest niespokojny lub nie chce być stale podłączony do pompy żywieniowej.

Żywnienie przerywane. Żywnienie jest podawane przez całą dobę z przerwami np. 3h żywienia i 2 h przerwy itd. Pozwala to na większą mobilność chorego.

Żywnienie nocne. Żywnienie jest podawane w okresie nocnym, co umożliwia większą swobodę chorego w ciągu dnia. Jest to metoda użyteczna w przypadku pacjentów, u których żywnienie dojelitowe jest dodatkiem żywienia doustnego. Należy jednak pamiętać o następstwach podawania dużych objętości płynów.

Żywnienie ciągle. Dietę podaje się do 20 h bez przerwy. Idealnym rozwiązaniem jest użycie pompy, jednak w przypadku ograniczonych środków dawniejsza metoda kroplowego wlewu grawitacyjnego diety jest nadal skuteczna.

Źródło: Podstawy żywienia klinicznego, red. naukowa Teresa Korta, Małgorzata Łyszkowska

Opracowała: Ewa Wolny - dietetyk

ONDYNIATOR
Oddziału Chorób Wewnętrznych
dr n. med. Józef Andrzejewski
specjalista chorób wewnętrznych
6897153