

Zalecenia dla Pacjenta ambulatoryjnego

– zgłaszającego się do Pracowni Endoskopii w celu wykonania kolonoskopii

➤ **na 5-7 dni** przed badaniem Pacjent odstawia **leki wpływające na krzepliwość krwi** (Acard, Polocard, Plavix, Warfin, Acenokumoral, Clopidogrel)

na 3-4 dni przed badaniem Pacjent odstawia leki **leki wpływające na krzepliwość krwi** (Xalerto, Pradaxa, Eliquis)

Decyzja o odstawieniu leku przeciwkrzepliwego musi być uzgodniona z lekarzem rodzinnym.

➤ **3 dni przed** badaniem obowiązuje dieta bez drobnych pestek (nie spożywamy pieczywa z ziarnami, owoców kiwi, winogron).

➤ w dniu czyszczenia, czyli w dniu poprzedzającym badanie oraz w dniu badania **Pacjent nie zażywa leków przeciwcukrzycowych** (lekarz rodzinny **powinien pouczyć** Pacjenta o konieczności wykonania dobowego profilu cukru lub konieczności stosowania insuliny krótko działającej).

➤ **na 2 dni przed** badaniem nie należy spożywać żadnych posiłków za wyjątkiem klarownych zup (rosół), galaretek, kisielu.

➤ w dniu poprzedzającym badanie Pacjent przygotowuje środek przeczyszczający **FORTTRANS** – 3 litry preparatu, rozpuszczając każdą z 3 torebek w 1 litrze niegazowanej wody (1 torebka/1 litr) i wypija bezpośrednio po przygotowaniu. **W przypadku pacjenta z niewydolnością nerek stosuje się CITRAFLEET**

➤ **rano w dniu badania** przygotować roztwór 1 torebka w 1 litrze niegazowanej wody i wypić bezpośrednio po przygotowaniu.

➤ zaleca się, aby ostatnią szklankę wody wypić na 4-5 godzin przed badaniem.

➤ w celu skutecznego oczyszczenia jelit oraz zapewnienia właściwego nawodnienia organizmu należy przyjmować ok. 2 litrów wody niegazowanej pomiędzy porcjami środka przeczyszczającego (im więcej pacjent wypija wody tym lepiej zadziała środek przeczyszczający).

➤ od chwili wypicia środka przeczyszczającego aż do wykonania badania **nie należy spożywać żadnych posiłków.**

➤ wypicie środka przeczyszczającego spowoduje częste oddawanie stolca. Początkowo stolec będzie zbliżony do normalnego, następnie będzie stawał się coraz bardziej płynny. Stolce pacjenta prawidłowo przygotowanego do badania są **całkowicie płynne i bezbarwne (pacjent oddaje „czystą wodę”)**.

➤ wskazane jest zgłoszenie się do Pracowni Endoskopii około 10 minut przed wyznaczoną godziną badania

➤ Na badanie w znieczuleniu ogólnym **pacjent przychodzi z osobą towarzyszącą**

➤ przed planowaną kolonoskopią, Pacjent **obowiązkowo musi** wykonać badania układu **krzepnięcia (INR, APTT)**.

➤ prosimy o przyniesienie posiadanej dokumentacji medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem **wypisów szpitalnych oraz opisów badań endoskopowych**.

➤ badanie może się wiązać z odczuwaniem dolegliwości bólowych.

➤ po zapoznaniu się z możliwymi powikłaniami związanymi z wykonywaniem badania, Pacjent podpisuje świadomą zgodę na jego wykonanie.

Rejestracja i odbiór wyników

pon -pt 7:30 – 15:00

Tel. 32 3257555